

 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi	
	PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI HASTA VE AİLE BİLGİLENDİRME FORMU-4 (SABİT PROTEZLER)	Dok. No: FR/234/036 İlk Yayın Tar.: 19.03.2019 Rev. No/Tar.: Sayfa: 1/1

PR-4

SABİT PROTEZLER

Sabit protezler; kayıp diş veya diş dokusunun restorasyonu amacıyla, diş veya dişler üzerine yapıştırılan ve hasta tarafından çıkarılamayan, sadece hekim tarafından çıkarılabilen protez türleridir. Sabit protez gereksiniminin muhtemel sebepleri; yetersiz ağız bakımı, diş çürükleri, travma ve/veya dişeti hastalıkları sonucu oluşmuş olan diş veya diş dokusu kayıplarıdır. Bu durumda eğer tedavi yapılmaz ise kalan dişlerin sağlığında bozulmalar, diş kaymaları, dişler arası kapanış ilişkisinin bozulması, diş çürükleri, diş ağrıları, kalan diş dokusunun kırılması, diş çekimi gereksinimi gibi durumların yanı sıra, çene-yüz sisteminin dengesinin bozulması, dengesiz çiğnemeye bağlı çene eklemine hasar görmesi, estetik problemler, konuşma problemleri, yeterince çiğneme yapılamadığından oluşacak sindirim sistemi sorunları, genel sağlığın bozulması ve yaşam konforunun düşmesi, daha sonra yapılacak tedavilerin daha karmaşık ve maliyetli olması gibi durumlar görülebilir.

Sabit protez yapımı için doğal diş veya dişlerinizin bir miktar kesilerek küçültülmesi gerekmektedir. Gereken kesim miktarı sabit protezin türüne, kullanılacak malzemeye ve dişleriniz arasındaki mesafeye göre farklılık gösterir. Genellikle dişin her yönünden yaklaşık 1,2-2 mm arasında kesim yapılır. Canlı dişlerde kesim işlemi lokal anestezi altında gerçekleştirilir. Kesim işlemi sonrası bazı dişlerde kanal tedavisi ihtiyacı oluşabilir. Kanal tedavisi sonrası bazı durumlarda protetik planlama değişebilir ve değişen plana bağlı olarak tedavi maliyetinde farklılıklar oluşabilir. Tedavi süresi yaklaşık olarak 1-4 hafta kadar sürmektedir. Ölçü veya laboratuvar işlemlerindeki hatalardan dolayı seansların tekrarlanması gerekebilir ve tedavi süresi uzayabilir. Dişlerin kesilmesinden protezlerin daimi yapıştırılmasına kadar geçen süre içerisinde dişlerinizi korumak için geçici kuronlar hazırlanır. Geçici kronların yapım işlemleri iki iş günü içerisinde tamamlanabilmektedir. Bu nedenle dişlerin kesildiği seansta takılamayabilir. Bekleme sürecinde canlı dişlerinizde hassasiyet ve ön bölgede estetik olmayan bir görünüm oluşabilmektedir. Geçici kronların kullanımı sırasında yerinden çıkması, sallanması, yutulması, boğaza kaçması gibi istenmeyen durumlar oluşabilir. Bu ve benzeri durumların oluşmaması için daimi proteziniz takılınca kadar geçici kronların dikkatlice kullanılması gerekir. Geçici kronların düşmesi durumunda ihmal edilmeden kliniğimize başvurulmalıdır, aksi takdirde dişlerde enfeksiyon, pozisyon değişiklikleri ve diş eti problemleri oluşabilir. Geçici kronların hasta tarafından kaybedilmesi durumunda yeniden yapılması için ek ücret ödemeniz gerekebilir.

Fakültemizde sabit protezler uygun vakalarda bilgisayar destekli tasarım ve üretim (CAD/CAM) teknolojisi ile dijital ölçü alınarak ta yapılabilir. Bu teknolojinin kullanımı ve malzemeleri ilave ücretler gerektirmektedir.

Çürük veya kırılma sonrası yeterli diş dokusu bulunmayan dişlerde sabit protez uygulayabilmek için kanal tedavisi ve post uygulaması gerekebilir. Post diş kökü içerisine yerleştirilen vida veya millerdir. Post için kullanılan malzemenin çeşidine göre ilave masraflar gerekebilir. Postlar zamanla çeşitli nedenlerden dolayı kırılabilir, düşebilir veya diş kökü kırıklarına neden olabilir, bu durumda dişe herhangi bir müdahale mümkün olmayabilir ve dişin çekimine karar verilebilir.

Protezlerin yapıştırılması sonrası ağızda yabancı madde hissi, dişlerde hassasiyet, protezde çatlama, kırılma, gevşeme, düşme veya çene eklemi ağrıları gibi durumlar görülebilir. Kullanım esnasında yanak ısırma, konuşma değişikliği, tükürük artışı, alerji ve yanma, yükseklik hissi gibi durumlar oluşabilmektedir. Bu durumlarla karşılaşıldığında en kısa sürede kliniğimize başvurmanız gerekmektedir. Sorunların giderilmesi için laboratuvar işlemleri gerekli olduğunda masraflar hasta tarafından karşılanır.

Sabit protezlerin temizliği diş ipi ve diş fırçası ile eksiksiz olarak yapılmalı ve düzenli periyotlar ile diş hekimine kontrol amaçlı başvurulmalıdır.

Sabit protez tedavisinde dişlerin kesilmemesi için alternatif tedavilerden biri hareketli protez seçeneğidir, ancak bu durum sabit proteze göre konforu ve çiğneme etkinliğini düşürmektedir. Diğer alternatif tedavi seçeneği ise implant destekli protezlerdir. Bu protezler maliyet açısından daha yüksek ücrete sahiptirler. Ayrıca çene kemiğinin ve dişsiz boşluğun uygun şartlara sahip olması gerekir.

Sabit protez tedavisinin başında veya tedavi devam ederken hastanın tedaviden vazgeçmesi durumunda, tedavinin yapılmamasına ve yarım bırakılmasına bağlı görülen komplikasyonlar ve yarım kalan tedaviye ait laboratuvar masrafları açısından sorumluluk hastaya aittir.

Kurumumuz üniversite hastanesi olduğundan dolayı yapılacak olan tedaviniz öğretim üyesi, uzman diş hekimi, asistan diş hekimi veya fakülte öğrencisi tarafından ilgili kliniklerde yürütülebilir. Fakültemizde yapılan sabit protez tedavisi için diş sayısına bağlı olarak katkı payı ödemeniz gerekmektedir. Protezin yapımında farklı malzemelerin kullanımı veya tedavinizin öğretim üyesi tarafından gerçekleştirilmesi durumunda ek ücretler gerekebilir.