

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi	
	PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI HASTA VE AİLE BİLGİLENDİRME FORMU-2 (TAM PROTEZLER)	Dok. No: FR/234/034
		İlk Yayın Tar.: 19.03.2019
		Rev. No/Tar.:
		Sayfa: 1/1

PR-2

TAM PROTEZLER

Tam protezler, ağızda dişlerin bulunmadığı durumlarda uygulanan hareketli protezler türüdür. Ağızdaki tam dişsizlik durumunun muhtemel sebepleri; yetersiz ağız bakımı, diş çürükleri, travma ve/veya dişeti hastalıkları sonucu gerçekleşmiş olan diş kayıplarıdır. Tedavi edilmeyen tam dişsizlik durumu çene-yüz sistemin dengesinin bozulması, çene ekleminin hasar görmesi, ağız açıklığının azalması, yüzde dikey boyut kaybı, estetik problemler, konuşma problemleri, yeterince çiğneme yapılamadığından oluşacak sindirim sistemi sorunları, genel sağlığın bozulması ve yaşam konforunun düşmesi, daha sonra yapılacak tedavilerin daha karmaşık ve maliyetli olması gibi durumlara neden olabilir. Bu protez tipinde alt ve üst damakların üzerine oturan pembe akrilik taban üzerine yerleştirilmiş yapay dişler mevcuttur. Alt ve üst damak yüzeylerinde düzensizlik, kemik çıkıntıları, diş eti büyümesi, yetersiz damak yüksekliği vb. durumlar varlığında tam protez yapımı öncesi cerrahi olarak dokunun şekillendirilmesi veya mantar enfeksiyonu gibi durumlarda medikal tedavi gerekebilmektedir. Protezinizin yapımı normal şartlarda 5-6 seans sürer (yaklaşık 3-4 hafta). Ancak ölçü veya laboratuvar işlemlerindeki problemlerden dolayı seansların tekrarlanması gerekebilir ve tedavi süresi uzayabilir. Tam protezlerin destek alabileceği doğal diş bulunmadığından proteze alışması ve kullanımı diğer protez türlerine göre daha zordur ve protezin ağızda oynaması daha fazla olur. Protezin üzerine oturduğu kemik yapısının yetersiz olduğu durumlarda tutuculuk daha da azalır. Özellikle alt protez dil hareketlerinden olumsuz etkilendiğinden, üst proteze göre oynaması daha fazla olur. Bu durumlarda ek seçenek olarak implant destekli tam protezler önerilmektedir.

Hem ağızınıza yerleştirilen protez, hem de kendi sağlığınız için ağız bakımına özen göstermeniz gerekmektedir. Tam protezler her yemekten sonra çıkarılıp dikkatlice fırçalanmalıdır. Protezin altında kalan dokular da yumuşak bir diş fırçası ile fırçalanmalıdır. Dokuların dinlenmesi için tam protezler uyku sırasında takılmamalı, su dolu bir kabın içerisinde bekletilmelidir.

Yeni protezlere alışma süreci birkaç haftadan birkaç aya kadar değişiklik gösterebilir. Protezlere alışabilmeniz için onları kullanmanız gerekmektedir. Sıkça ağızdan çıkarılan protezler bir süre sonra ağızla uyumunu yitirirler ve protezlere alışmanız mümkün olmayabilir. Tam protezlere alışma sürecinde kişi protezi kullanmaya kararlı ve zorluklar karşısında sabırlı olmalıdır. Tam dişsizlik durumunda uygun vaklarda tam protezlere alternatif olarak implant destekli sabit veya implant destekli hareketli protezler yapılabilir. Ancak bu tedavilerin maliyeti tam protezlere göre daha fazladır.

Protez sonrası vuruks yaraları, konuşmada ve çiğnemede zorlanma, yanak ısırma, eklemlerde ağrı, tükürük salgısında artış, protezin altında yiyecek birikmesi, tat almada zorlanma, çeşitli nedenlerle kırıma veya çatlama, yapay dişlerin düşmesi, protezde kullanılan materyallere karşı alerjik belirtiler görülebilir. Kemik dokusundaki kayba bağlı olarak zaman içerisinde tutuculukta azalma olabilir ve tutuculuğu sağlamak için ek laboratuvar işlemleri gerekebilir. Bu durumlarla karşılaşıldığında en kısa sürede kliniğimize başvurmanız gerekmektedir. Bu sorunların bir kısmı hekiminiz tarafından giderilebilecek sorunlar iken, bir kısmı ise laboratuvar işlemi gerektiren durumlardır. Laboratuvar da tamir edilmesi gerektiği durumlarda, yaklaşık birkaç gün protezlerin laboratuvar da bulunması gerebilir ve hasta protezsiz bir şekilde beklemek durumunda kalabilir. Protezle ilgi sorunların giderilmesi için gerekli ek masraflar hasta tarafından karşılanır.

Yapılacak tedavilerin başarısı hastadan hastaya değişebilir ve protezin ömrü ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

Tedavinin başında veya tedavi devam ederken hastanın tedaviden vazgeçmesi durumunda, tedavinin yapılmamasına bağlı görülen komplikasyonlar ve yarım kalan tedaviye ait laboratuvar masrafları gibi maddi zararlar açısından sorumluluk hastaya aittir.

Kurumumuz üniversite hastanesi olduğundan dolayı yapılacak olan tedaviniz öğretim üyesi, uzman doktor, diş hekimi veya fakülte öğrencisi tarafından ilgili kliniklerde yürütülebilir. Fakültemizde yapılan tam protez tedavisi için katkı payı ödemeniz gerekmektedir. Protezin yapımında farklı malzemelerin kullanımı veya tedavinizin öğretim üyesi tarafından gerçekleştirilmesi durumunda ek ücretler yatırmanız gerekebilir.