

 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi	
	PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI HASTA VE AİLE BİLGİLENDİRME FORMU-5 (SABİT PROTEZLERİN SÖKÜMÜ VE YAPIŞTIRILMASI)	Dok. No: FR/234/037 İlk Yayın Tar.: 19.03.2019 Rev. No/Tar.: Sayfa: 1/1

PR-5

SABİT PROTEZLERİN SÖKÜMÜ VE YAPIŞTIRILMASI

Sabit protezlerin sökümü

Ağızdaki mevcut sabit protezlerin sökülmesi gereksinimi; protezin altındaki doğal dişlere ait sorunlar, protezlerin eskimesi, kırılması, deformasyonu, uyumunun bozulması veya ileri tedavi planı için dişlerin değerlendirilmesi nedeniyle olabilir. Sabit protezlerin söküm işlemi ortalama 15 dak-1 saat kadardır. Söküm işlemi sırasında çeşitli aletler ile vuruş veya titreşim şeklinde proteze kuvvet uygulanır. Uygulanan kuvvet sizde rahatsızlık hissi oluşturabilir. Kullanılan aletler keskin aletlerdir. Söküm sırasında alet kayabilir ve yumuşak dokularınıza zarar verebilir. Uygulama sırasında ağrı duymamanız için lokal anestezi yapılabilir. Sökülen sabit protezin ağza düşmesi sonucu kontrolsüz bir şekilde yutulması veya soluk borusuna kaçması gibi istenmeyen durumlarla karşılaşılabilir. Söküm işlemi sırasında protezinizde kırılmalar, bozulmalar veya eğilmeler oluşabilir. Protezin altındaki doğal dişler kırılabilir veya protezle birlikte çıkabilir. Bu durumda tedavi planı değişebilir ve bu durumdan doğacak ek ücretler hastaya aittir. Destek dişlerdeki periodontal hasar varlığında veya vurma işlemi ile çıkarılamayan protezlerin kesilerek çıkarılması gerekebilir. Bu durumda mevcut proteziniz tekrar kullanılamayacak hale gelebilir ve yenilenmesi gerekebilir. Protezin tekrar kullanılamayacağı durumlarda söküm sonrası destek dişlerin korunması için geçici protez yapımı gereklidir. Geçici protez yapımı için gereken ek ücret hasta tarafından karşılanır. Geçici protez yapım işlemleri iki iş günü içerisinde gerçekleştirilmektedir. Bekleme sürecinde canlı dişlerinizde hassasiyet ve ön bölgede estetik olmayan bir görünüm oluşabilmektedir. Eğer geçici protez yaptırılmaz ise uzun süre açıkta kalan kesilmiş dişlerde enfeksiyon gelişebilir. Protezlerin sökümü ve sonrasında oluşabilecek problemlerle ilgili olarak en kısa sürede kliniğimize başvurmanız gerekmektedir. Tedavinin başında ya da tedavi devam ederken hastanın tedaviden vazgeçmesi durumunda, ortaya çıkan komplikasyonlar ve istenmeyen durumlarda sorumluluk hastaya aittir. Kurumumuz üniversite hastanesi olduğundan dolayı yapılacak olan tedaviniz öğretim üyesi, uzman diş hekimi, asistan diş hekimi veya fakülte öğrencisi tarafından ilgili kliniklerde yürütülebilir.

Sabit protezlerin yapıştırılması

Sabit protezlerin dişler üzerine yapıştırılması işlemine “simantasyon” denir. Yeni yapılan protezler, kendiliğinden düşmüş veya hekim tarafından çıkarılmış protezler veya geçici protezler için simantasyon işlemi gerekebilmektedir. İşlemin ortalama süresi 10-45 dakikadır. Simantasyon işlemi daimi veya geçici olarak yapılabilir. Daimi simantasyon işlemi protezlerin uzun süre ağızda kalabilmeleri amacıyla, geçici simantasyon işlemi ise kısa süreli ağızda kalabilmesi ve gerektiğinde kolaylıkla protezin çıkarılabilmesi amacıyla kullanılır.

Simantasyon işlemi sırasında, temizlik ve yapıştırma amacıyla diş yüzeyine çeşitli kimyasal maddeler uygulanmakta ve bunlar nadiren de olsa diş etlerinde tahriş ve alerjik reaksiyonlara yol açabilmektedir. Yapıştırıcı artıklarının temizlenmesi sırasında diş etlerinde kanama ve tahriş oluşabilmektedir. Simantasyon sonrası hassasiyet ve ağrı gelişebilmektedir. Simantasyon işlemi, kullanılacak malzemeye bağlı olarak ek masraflara neden olabilir. Simantasyon sonrası belirli bir süre yemek yememeniz istenebilir. Geçici simantasyon uygulanmış protezlerde protezin yerinden çıkması, sallanması, yutulması, boğaza kaçması gibi istenmeyen durumlar oluşabilir. Bu ve benzeri durumların oluşmaması nedeniyle geçici yapıştırılan protezler hasta tarafından dikkatli kullanılmalı ve uzun zaman dilimlerinde kullanılmamalıdır. Protezlerin simantasyonu ve sonrasında oluşabilecek problemlerle ilgili olarak en kısa sürede kliniğimize başvurmanız gerekmektedir. Tedavinin başında veya tedavi devam ederken hastanın tedaviden vazgeçmesi durumunda, ortaya çıkan komplikasyonlar ve istenmeyen durumlarda sorumluluk hastaya aittir. Kurumumuz üniversite hastanesi olduğundan dolayı yapılacak olan tedaviniz öğretim üyesi, uzman diş hekimi, asistan diş hekimi veya fakülte öğrencisi tarafından ilgili kliniklerde yürütülebilir.