

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi	
	PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI HASTA VE AİLE BİLGİLENDİRME FORMU-3 (HAREKETLİ BÖLÜMLÜ PROTEZLER)	Dok. No: FR/234/035 İlk Yayın Tar.: 19.03.2019 Rev. No/Tar.: Sayfa: 1/1

PR-3

HAREKETLİ BÖLÜMLÜ PROTEZLER

Hareketli bölümlü protezler; bir veya birden çok dişin eksik olduğu durumlarda uygulanan, metal ve akrilik kısımları bulunan ve hastalar tarafından takılıp çıkarılabilen protez türleridir. Hareketli protez kullanımı gereksiniminin muhtemel sebepleri; yetersiz ağız bakımı, diş çürükleri, travma ve/veya dişeti hastalıkları sonucu olabilen diş kayıplarıdır. Eğer tedavi yapılmaz ise kalan dişlerin sağlığında bozulmalar, diş kaymaları, diş devrilmeleri, diş çürükleri, diş ağrıları, diş iltihaplanmaları, diş çekimi gibi durumların yanı sıra, çene-yüz sisteminin dengesinin bozulması, çene eklemine hasar görmesi, ağız açıklığının azalması, dikey boyut kaybı, estetik problemler, konuşma problemleri, yeterince çiğneme yapılamadığından oluşacak sindirim sistemi sorunları, genel sağlığın bozulması ve yaşam konforunun düşmesi, daha sonra yapılacak tedavilerin daha karmaşık ve maliyetli olması gibi durumlar görülebilir.

Hareketli bölümlü protezlerde tutuculuk dişlere uygulanan kroşeler (Metal kancalar) veya hassas metal bağlantılar (Çıtçıtlar) yoluyla sağlanır. Kroşeler özellikle ön dişlerde estetik görünümü bozabilir. Hassas bağlantılar dışarıdan görülmezler ancak uygulanabilmesi için diş ve ağız yapınızın uygun olması ve bir kısım dişlerinizin kesilerek kaplanması gerekmektedir. Ayrıca yapımı ve tamiri daha maliyetlidir. Hareketli bölümlü protezlerin metal parçalarının uygun pozisyonda yerleşebilmesi için doğal dişlerinizin yüzeyinde çeşitli aşındırma işlemleri uygulanabilmektedir. Protezinizin yapımı normal şartlarda 5-6 seans (yaklaşık 3-4 hafta) sürer. Ancak ölçü veya laboratuvar işlemlerindeki problemlerden dolayı seansların tekrarlanması gerekebilir ve tedavi süresi uzayabilir.

Hem ağızınıza yerleştirilen protez, hem de kendi sağlığınıza için ağız bakımınıza özen göstermeniz gerekmektedir. Hareketli protezler her yemekten sonra çıkarılıp fırçalanmalıdır. Destek dişler ve dişsiz alandaki dokular da ayrıca fırçalanmalıdır. Dokuların dinlenmesi için protezler uyku sırasında takılmamalı, su dolu bir kabın içerisinde bekletilmelidir. Düzenli periyotlar ile diş hekimine kontrol amaçlı başvurulmalıdır.

Yeni protezlere alışma süreci birkaç haftadan birkaç aya kadar değişiklik gösterebilir. Protezlere alışabilmeniz için onları hekiminizin önerdiği şekilde kullanmanız gerekmektedir. Sıkça ağızdan çıkarılan protezlere alışmanız mümkün olmayabilir ve protezler bir süre sonra ağızla uyumunu yitirebilirler. Bu durumda gerekli olan tamir ve yenileme masrafları hasta tarafından karşılanır.

Protez sonrası vuruk yaraları, protezin metal parçalarında kopma, akrilik bölümlerinde kırılma, yapay dişlerin düşmesi, kırılması, doğal dişlerde ağrı, hassasiyet, sallanma, çürüme, kemik kaybı, kırılma veya aşınmalar görülebilir. Destek dişlerde meydana gelen sorunlar sonucu ilave tedaviler veya diş çekimi gerekebilir. Özellikle ilk defa hareketli bölümlü protez kullanan hastalarda protezlerin oynadığını hissetme ve konuşmada zorlanma daha sık görülebilir. Yemek yerken gıdaların yeterince çiğnenememesi, protezin altına yemek artıklarının kaçması, protezlerle doğal dişler arasına yemek artıklarının sıkışması görülebilir. Tükürük salgısında geçici bir artış görülebilir. Kullanıma ve zamana bağlı olarak protezin tutuculuğu azalabilir. Protezde kullanılan materyallere karşı alerjik belirtiler görülebilir. Bu durumlarla karşılaşıldığında en kısa sürede kliniğimize başvurmanız gerekmektedir. Bu sorunların bir kısmı hekiminiz tarafından giderilebilecek sorunlar iken, diğer kısmı ise laboratuvar işlemi gerektiren durumlardır. Laboratuvarda tamirin gerektiği durumlarda birkaç gün kadar protezlerinizi kullanamayabilirsiniz. Sorunların giderilmesi için gerekli ek masraflar hasta tarafından karşılanır. Yapılacak tedavilerin başarısı hastadan hastaya değişebilir ve protezin ömrü ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

Tedavinin başında veya tedavi devam ederken hastanın tedaviden vazgeçmesi durumunda, tedavinin yapılmamasına bağlı görülen komplikasyonlar ve yarım kalan tedaviye ait laboratuvar masrafları açısından sorumluluk hastaya aittir.

Hareketli bölümlü protezlere alternatif olarak uygun vakalarda implant destekli protezler uygulanabilmektedir. Ancak bu durumda tedavi maliyeti artmaktadır.

Kurumumuz üniversite hastanesi olduğundan dolayı yapılacak olan tedaviniz öğretim üyesi, uzman doktor, diş hekimi veya fakülte öğrencisi tarafından ilgili kliniklerde yürütülebilir. Fakültemizde yapılan hareketli bölümlü protez tedavisi için katkı payı ödemeniz gerekmektedir. Protezin yapımında farklı malzemelerin kullanımı veya tedavinizin öğretim üyesi tarafından gerçekleştirilmesi durumunda ek ücretler yatırmanız gerekebilir.