

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>İZMİR<br/>KÂTİP ÇELEBİ<br/>ÜNİVERSİTESİ</b></p> <p><b>TS EN ISO<br/>9001:2015</b></p> | <p><b>T.C.</b><br/><b>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b><br/><b>Diş Hekimliği Fakültesi</b></p> <p><b>PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI</b><br/><b>HASTA VE AİLE BİLGİLENDİRME FORMU-6</b><br/><b>(İMLANT DESTEKLİ PROTEZLER)</b></p> |  <p><b>Dok. No:</b> FR/234/038<br/><b>İlk Yayın Tar.:</b> 19.03.2019<br/><b>Rev. No/Tar.:</b><br/><b>Sayfa:</b> 1/1</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **PR-6 İMLANT DESTEKLİ PROTEZLER**

İmlantlar; eksik dişlerin protetik açıdan restorasyonu için dişsiz bölgedeki kemiğe cerrahi işlem ile yerleştirilen vidalardır. Belirli bir bekleme süresi sonunda imlantın üzerine yerleştirilen çeşitli parçalar yoluyla protez oluşturulur. İmlant üstü protez sabit veya hareketli olabilir.

İmlant gereksinimi; yetersiz ağız bakımı, diş çürükleri, travma, çene ameliyatı ve/veya dişeti hastalıkları sonucu gerçekleşmiş olan diş kayıpları nedeniyle olabilir. Eğer dişsiz boşluk zamanında tedavi edilmez ise kalan dişlerin sağlığında bozulmalar, diş kaymaları, diş devrilmeleri, diş çürükleri, diş ağrıları, diş iltihaplanmaları, diş çekimi gibi durumların yanı sıra, çene-yüz sisteminin dengesinin bozulması, çene eklemine hasar görmesi, ağız açıklığının azalması, dikey boyut kaybı, estetik problemler, konuşma problemleri, yeterince çiğneme yapılamadığından oluşacak sindirim sistemi sorunları, genel sağlığın bozulması ve yaşam konforunun düşmesi, daha sonra yapılacak tedavilerin daha karmaşık ve maliyetli olması gibi durumlar görülebilir.

Dişsiz boşluğun tedavisi için imlant tedavisinden başka vakanın durumuna göre sabit protez, hareketli bölümlü protez veya tam protez seçeneklerinden biri uygulanabilmektedir. Sabit protez seçeneğinde doğal dişlerden kesim yapmak gerekmektedir. İmlant destekli olmayan hareketli ve tam protez çeşitlerinde, kullanım konforu imlant destekli olanlardan daha düşüktür. Bazı durumlarda daha az sayıda imlant kullanımı ile imlant destekli hareketli protezler yapılabilir.

İmlant üstü protezlerin yapımı normal şartlarda 3-6 seans sürer (yaklaşık 2-4 hafta). Ancak ölçü veya laboratuvar işlemlerindeki problemlerden dolayı seansların tekrarlanması gerekebilir ve tedavi süresi uzayabilir. İmlant cerrahisi sırasında çeşitli sebeplerle doğru konumlandırılmamış veya istenen sayıda yerleştirilememiş imlantlar olursa üzerine yapılacak protez şekli de değişecektir. Hatta hiç istenmeyen pozisyonunda konumlanmış veya kemik desteği yeterli olmayan bir imlant varsa üzerine protez yapılamayabilir.

İmlant provaları sırasında imlant parçalarının ağza düşmesi sonucu kontrolsüz bir şekilde yutulması veya soluk borusuna kaçması gibi istenmeyen durumlar ile karşılaşılabilir. Yeni proteze alışma süreci birkaç haftadan birkaç aya kadar değişiklik gösterebilir. Yeni takılan protezlerde kullanım esnasında, ağızda vuruks, yanak ısırma, konuşma değişikliği, tükürük artışı, yabancı madde hissi, alerji ve yanma gibi durumlar oluşabilmektedir. Bu durumlarla karşılaşıldığında en kısa sürede kliniğimize başvurmanız gerekmektedir. Bu sorunların bir kısmı hekiminiz tarafından giderilebilecek sorunlar iken, bir kısmı ise laboratuvar işlemi gerektiren durumlardır. Sorunların giderilmesi için gerekli ek masraflar hasta tarafından karşılanır.

Protez parçalarında kırık ve çatlamlar, imlant parçalarında kırık, vidalarda kırık ve/veya gevşemeler görülebilir. İmlant ve vida parçalarında kırılmalar neticesinde imlant kullanılamaz hale gelebilir ve protetik planlama değişebilir. Protetik malzemeye alerji, dişeti hastalıkları, ağız bakımının ihmal edilmesi, diğer ağız hastalıkları veya sistemik hastalıkların ağız bulguları nedeni ile protezler ve/veya imlantların kaybı gibi sorunlarla karşılaşma riski vardır. Herhangi bir riske bağlı olarak imlantların cerrahi olarak uzaklaştırılması ve yerine diğer protetik tedavi yöntemlerinin uygulanması gerekebilir. Bu durumlarda, ilgili ek maliyetler hasta tarafından karşılanır.

Günümüzdeki imlant kayıplarının en önemli sebebi hijyen eksikliğine bağlı olarak imlant çevresinde görülen diş eti hastalığıdır. Bu nedenle imlant destekli protezlerde imlantların ve protezlerin fırçalanması, gerekli hallerde diş ipi, ara yüz fırçası, ağız duşu..vs hijyen araçlarının kullanılması ve temizliğinin titizlikle sağlanması çok önemlidir. Protezin teslimi sonrası düzenli (ilk hafta, ilk ay, üçüncü ay, altıncı ay ve birinci yılsonunda, üç yıl boyunca yılda en az iki defa ve takip eden yıllarda yılda bir kez) olarak kontrol randevularına gelmek gerekir.

Yapılacak tedavilerin başarısı hastadan hastaya değişebilir ve protezin ömrü ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir. Tedavinin başında ya da tedavi devam ederken hastanın tedaviden vazgeçmesi durumunda, ortaya çıkan komplikasyonlar ve laboratuvar masrafları gibi maddi zararlar açısından sorumluluk hastaya aittir.

Kurumumuz üniversite hastanesi olduğundan dolayı yapılacak olan tedaviniz öğretim üyesi, uzman diş hekimi, asistan diş hekimi veya fakülte öğrencisi tarafından ilgili kliniklerde yürütülebilir. Fakültemizde yapılan imlant destekli protez tedavisi için katkı payı ödemeniz gerekmektedir. Protezin yapımında farklı malzemelerin kullanımı veya tedavinizin öğretim üyesi tarafından gerçekleştirilmesi durumunda ek ücretler yatırmanız gerekebilir.