

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi	
	PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI HASTA VE AİLE BİLGİLENDİRME FORMU-1 (LOKAL ANESTEZİ)	
		Dok. No: FR/234/033 İlk Yayın Tar.: 19.03.2019 Rev. No/Tar.: Sayfa: 1/1

PR-1

LOKAL ANESTEZİ

Sayın hastamız; size uygulanacak olan protetik işlemler sırasında acı hissetmemeniz amacıyla lokal anestezi uygulanabilir. Bu uygulamalar bilimsel ve etik olarak bütün dünyada kabul edilmiş uygulamalardır. Gerekli hallerde öncelikle topikal anestetik madde (sprey) ile dişeti veya yanağın iç kısmı uyuşturulacaktır. Anestetik sıvı enjektör ile enjekte edilerek, diş ve bulunduğu bölge bir süreliğine hissizleştirilir. Anesteziğin etkisi 2-4 saat sonrasında ortadan kalkar. Lokal anestezi işlemi gereken durumlarda, eğer uygulanmaz ise işlemler çok ağrılı olacağından yapılamamakta veya daha komplike bir işlem/sedasyon altında yapılmaktadır. Kurumumuz üniversite hastanesi olduğundan dolayı yapılacak olan tedaviniz öğretim üyesi, uzman diş hekimi, asistan diş hekimi veya fakülte öğrencisi tarafından ilgili kliniklerde yürütülebilir. Yapılacak lokal, bölgesel veya infiltratif anestezi uygulamaları esnasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek sorunlar şunlardır;

Tansiyon ve nabız düşmesi: İşlem sırasında veya sonrasında nabız ve tansiyonda değişimler olabilir. Hatta bu olay şuur kaybedip, bayılmaya kadar gidebilir.

Ağrı: Anestezi sırasında ve sonrasında bölgede anesteziye bağlı ağrı hissedilebilirsiniz. Ayrıca işlem sırasında ve sonrasında baş ağrısı görülebilir.

Sinirsel komplikasyonlar: Anestezi sonrası geçici veya kalıcı sinirsel hasarlar (tamamen hissizlik, aşırı hislilik) nadiren de olsa ortaya çıkabilir.

Bulantı ve kusma: İşlem sırasında veya sonrasında ortaya çıkabilir. Böyle durumlarda hekim ve ilgili sağlık ekibince gerekli müdahale yapılabilir.

Enfeksiyon: Her enjeksiyon tek kullanımlık enjektörler ile yapılmaktadır. Bunun dışında bölgenin de dezenfeksiyonu ile işlem sonrasında oluşabilecek enfeksiyon kontrolü sağlanmaktadır.

Kas ve damarları ilgilendiren komplikasyonlar: Anestezi sonrası uygulama bölgesi ile alakalı olarak kas tutulmasına bağlı hareket kısıtlılığı, buna bağlı ağız hareketlerinde azalma görülebilir. Özellikle arka dişler için yapılan anestezi sonrasında yüzde birkaç saat sürebilen bu bölgedeki damarların daralmasına bağlı olarak renk değişiklikleri gözlenebilir.

Müteakip anestezi uygulamaları: Kişiden kişiye değişen anatomik farklılıklar, uygulanan işlem süresinin uzunluğu, hastanın ağrı eşiğinin düşük olması ve işlemde ağrı duyduğunu belirtmesi gibi nedenler ile anestezi tekrarlanabilir. Uygulama sayısı hastanın sistemik durumu izin verecek ölçüde planlanır.

Alerjik reaksiyonlar: Anestetik solüsyonun kişinin vücudunda yarattığı yabancı reaksiyona bağlı olarak ciltte döküntüler, kızarıklıklar ve kaşıntı gibi hafif reaksiyonlar görülebileceği gibi, nefes darlığı, nabız düşmesi, tansiyon düşmesi ve nefes alma ve kalp atım işleminin durmasına kadar varabilecek ciddi etkiler görülebilir. Bunlar anestezi uygulanır uygulanmaz görülebileceği gibi işlemde saatler sonra da ortaya çıkabilir.

Hastanın kendine verebileceği zarar: Hastaların anestezi uygulaması esnasında ani hareket etmeleri son derece sakıncalıdır. Bu durumda lokal anestetik iğnenin kırılması, doku içerisine kaçması, iğnenin başka bir alana saplanması, yutulması veya anestezinin yanlış yere uygulanması gibi durumlar söz konusu olabilir. İşlemin sona ermesinin ardından anestezinin etkisinin yaklaşık olarak 2-4 saat kadar daha devam etmesi nedeniyle hastalar kendi kendine uyuşuk olan yanağını veya dilini ısırmamaya özen göstermelidirler.